



## CIPROFLOXACINA 500mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

**Composición:** Cada comprimido recubierto contiene: Ciprofloxacin (Como Clorhidrato de Ciprofloxacin 769,23mg) 500mg y Excipientes c.s.p.

**Indicaciones:** Tratamiento de las infecciones producidas por bacterias sensibles a la ciprofloxacin. Tratamiento de las infecciones no complicadas del tracto respiratorio superior. Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto urinario inferior. Tratamiento de la gonorrea. Tratamiento de la diarrea del viajero. Prevención y tratamiento de infecciones post-exposición por vía inhalatoria a *Bacillus anthracis* (Ántrax). Tratamiento de segunda línea en la infección causada por *Pseudomonas aeruginosa* sensible, en niños con Fibrosis Quística. Tratamiento de las infecciones severas y complicadas del tracto urinario debido a *Escherichia coli* sensible y, resistente a otros antimicrobianos en niños.

**Vía de administración:** Oral.

**Posología:** A juicio del Facultativo.

**Advertencias:** Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que por criterio médico el balance beneficio/riesgo sea favorable. De ser imprescindible su uso, por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase definitivamente la lactancia materna. Las fluoroquinolonas se encuentran contraindicadas en niños, sin embargo, la administración de ciprofloxacin con diagnóstico de infección por *B. anthracis*, *P. aeruginosa* y *E. coli* supera el posible riesgo articular. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.



**Precauciones:** Durante el uso prolongado de la ciprofloxacina deben realizarse evaluaciones periódicas de la esfera oftalmológica. Se debe reducir la dosis en pacientes con valores de depuración de creatinina inferiores a 50mL/minuto. Durante y después del uso de ciprofloxacina en niños con Fibrosis Quística deben realizarse evaluaciones periódicas de la esfera articular. Durante y después del uso de ciprofloxacina en niños, deben realizarse evaluaciones periódicas del sistema músculo–esquelético. Debe informarse al médico sobre problemas articulares previos del niño. Debe suspenderse el tratamiento si aparece dolor o inflamación articular o tendinoso.

**Contraindicaciones:** Alergia a los componentes de la fórmula. En pacientes menores de 18 años, excepto aquellos con diagnóstico de infección por *B. anthraxis*, *P. aeruginosa* o *E. coli* que requieran ciprofloxacina.