



GLICERINA 1,68g SUPOSITORIOS - USO PEDIÁTRICO

Composición: Glicerina 1,68g, Ácido esteárico, Bicarbonato de sodio y Cloruro de sodio.

Indicación: Laxante en condiciones que requieran evacuación rápida de la ampolla rectal.

Vía de administración: Rectal.

Posología (Dosis recomendada): Niños de 2 a 12 años: Un (01) supositorio por vía rectal una vez al día.

Advertencias: En caso de dolor abdominal, náuseas, vómitos y otros síntomas digestivos no usar este producto sin consultar al médico. Si los síntomas no ceden con el tratamiento luego de 24 a 48 horas, suspéndase su uso y consulte al médico. El uso prolongado de este producto, mayor a una semana, puede dar lugar a trastornos del colon. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Evítese el uso indiscriminado de este producto debido a que aumenta el riesgo de reacciones adversas. La administración de este producto en uso prolongado, por persistencia de los síntomas, debe hacerse por recomendación del médico.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con colitis hemorrágica, crisis hemorroidal aguda, deshidratación severa, diabetes mellitus, enfermedad renal, hipervolemia.