



LOPERAM 2mg TABLETAS Clorhidrato de Loperamida

Composición: Cada tableta contiene: Loperamida (Como Clorhidrato de Loperamida) 2,00mg, Almidón de maíz 62,40mg y Excipientes c.s.p.

Indicaciones: Tratamiento sintomático de la diarrea aguda no complicada y de la diarrea crónica asociada a enfermedad intestinal inflamatoria.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Niños de 9 a 11 años: Una (01) tableta cada 8 horas (6mg/día). Niños mayores de 12 años y Adultos: Dos (02) tabletas al inicio y luego una (01) tableta después de cada evacuación sin exceder de ocho (08) tabletas en 24 horas (16mg/día).

Advertencias: No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. El uso de este producto no sustituye el tratamiento usual de la diarrea con solución de rehidratación oral o la terapia antibiótica cuando ella se justifica. Si los síntomas persisten con el uso de este medicamento, suspenda su uso y consulte al médico. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Pacientes ancianos. Disfunción hepática leve a moderada.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Niños menores a 2 años. Pacientes con debilidad general, fiebre, heces con moco y/o sangre, insuficiencia hepática severa, vómitos.