



## NOVACODIN 50mg/5mL SOLUCIÓN ORAL Guaifenesina

**Composición:** Cada 5mL contienen: Guaifenesina 50,00mg, Glicerina 1,00g, Sucralosa 7,50mg y Excipientes c.s.p.

**Indicaciones:** Tratamiento de las afecciones respiratorias que cursan con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales.

Vía de administración: Oral.

**Posología (Dosis recomendada):** Niños de 2 a 6 años: 5mL cada 4 horas (300mg de Guaifenesina/día). Niños de 6 a 12 años: 10mL cada 4 horas (600mg de Guaifenesina/día). Niños mayores de 12 años y Adultos: 20mL cada 4 horas (1200mg de Guaifenesina/día).

**Advertencias:** Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este producto. No utilizar en niños menores a 2 años. Si los síntomas persisten por más de tres días con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Precauciones:** Este producto puede causar somnolencia durante su administración, evite actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental. Se ha asociado la formación de cálculos renales con la ingestión de grandes cantidades de guaifenesina por tiempo prolongado.

**Contraindicaciones:** Alergia a los componentes de la fórmula. Niños menores a 2 años. Pacientes con tos crónica, como la causada por asma, bronquitis, enfisema. Pacientes con porfiria.