



PROMEDINA 2mg-7,5mg/5mL SOLUCIÓN ORAL **Maleato de Clorfeniramina-Bromhidrato de Dextrometorfano**

Composición: Cada 5mL contienen: Clorfeniramina (Como Maleato de Clorfeniramina) 2,00mg, Dextrometorfano (Como Bromhidrato de Dextrometorfano) 7,50mg, Acesulfame K 5,00mg, Sucralosa 9,00mg y Excipientes c.s.p.

Indicación: Tratamiento de la tos de origen alérgico.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Niños menores de 2 años: Consulte al médico. Niños de 2 a 6 años: 2,5mL a 5mL cada 8 horas (3mg a 6mg de Clorfeniramina/día – 11,25mg a 22,50mg de Dextrometorfano/día). Niños mayores de 12 años y Adultos: 20mL cada 8 horas (24mg de Clorfeniramina/día – 90mg de Dextrometorfano/día).

Advertencias: Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este producto. Si los síntomas persisten por más de tres días con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. Este producto puede causar somnolencia durante su administración, evite actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Evite el consumo de bebidas alcohólicas y sedantes durante el uso de este producto. En pacientes con obstrucción del cuello vesical o retención urinaria.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminooxidasa, glaucoma de ángulo cerrado e hipertrofia prostática.