



## ANTIFOM 80mg/mL SUSPENSIÓN ORAL Simeticona

**Composición:** Cada mL (Equivalente a 20 gotas) contiene: Simeticona 80,00mg, Alcohol etílico 30,00mg, Metilparabeno 1,80mg, Propilparabeno 0,20mg, Sucralosa 0,60mg y Excipientes c.s.p.

**Indicaciones:** Alivio sintomático de los trastornos digestivos. Antiflatulento.

**Vía de administración:** Oral.

**Posología (Dosis recomendada):** Niños menores a 3 meses: Consulte al médico. Niños de 3 a 6 meses: 5 gotas (20mg) cada ocho (08) horas. Dosis máxima: 60mg/día. Niños de 6 meses a 1 año: 5 gotas a 10 gotas (20mg a 40mg) cada ocho (08) horas. Dosis máxima: 120mg/día. Niños de 1 año a 12 años: 10 gotas (40mg) cada ocho (08) horas. Dosis máxima: 120mg/día. Niños mayores a 12 años y Adultos: 10 gotas a 20 gotas (80mg a 160mg) de tres (03) a cuatro (04) veces al día. Dosis máxima: 640mg/día. El uso de dosis mayores no genera beneficios terapéuticos adicionales y, por el contrario, podría ocasionar la aparición de efectos adversos.



**Advertencias:** No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que por criterio médico el balance beneficio/riesgo sea favorable. Si los síntomas persisten por más de 3 días con el uso de este medicamento, suspenda su uso y consulte al médico. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Precauciones:** En caso de presentar dolor abdominal, estreñimiento, náuseas y/o vómito, no administre este medicamento sin consultar al médico. Este producto contiene alcohol etílico como parte de sus excipientes. Se debe descartar la posibilidad de sufrir de ciertos trastornos gastrointestinales como úlcera gastroduodenal, asociada a obstrucción gastroduodenal antes de administrar este medicamento.

**Contraindicaciones:** Alergia a los componentes de la fórmula. Estenosis pilórica.