



ATROVERAN 10mg/mL SOLUCIÓN GOTAS N-Butil-Bromuro de Hioscina

Composición: Cada mL contiene: N-Butil-Bromuro de Hioscina 10,00mg, Acesulfame K 8,00mg, Alcohol etílico al 95% 200,00mg, Maltodextrina 14,00mg, Sacarina de sodio 5,00mg, Solución de sorbitol al 70% 200,00mg, Sucralosa 1,00mg y Excipientes c.s.p.

Indicaciones: Tratamiento del dolor abdominal tipo cólico de moderada a fuerte intensidad.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Un (01) mL cada 8 horas (30mg/día).

Advertencias: Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este producto. En caso de ser imprescindible su uso, por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase definitivamente la lactancia materna. Si los síntomas persisten por más de 24 horas o presenta vómitos o fiebre con el uso de este medicamento, suspenda su uso y consulte al médico. Este producto puede causar somnolencia durante su administración, evite actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Pacientes ancianos. Pacientes con atonía muscular, colitis ulcerosa, esofagitis por reflujo, glaucoma de ángulo cerrado, insuficiencia renal y/o hepática, obstrucción intestinal o urinaria, úlcera gástrica.



Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con estenosis mecánica del tracto gastrointestinal, glaucoma de ángulo cerrado no tratado, hipertrofia prostática, íleo paralítico, megacolon, miastenia grave, retención urinaria, taquicardia.