



DIHIDROLIP 20mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Clorhidrato de Lercanidipina

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Lercanidipina (Como Clorhidrato de Lercanidipina) 20mg, Almidón pregelatinizado 20mg, Lactosa 90mg y Excipientes c.s.p.

Indicación: Tratamiento de la hipertensión arterial esencial leve a moderada.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): Dosis inicial en adultos: 10mg una (01) vez al día. En pacientes cuya respuesta al tratamiento después de cuatro (04) semanas resulte insuficiente, incrementar a 20mg una (01) vez al día. El uso de dosis mayores no genera beneficios terapéuticos adicionales y, por el contrario, podría ocasionar la aparición de efectos adversos.

Dosificación en pacientes especiales:

Ancianos: No se requieren ajustes de dosificación.

Insuficiencia hepática leve a moderada: No se requieren ajustes de dosificación.

Insuficiencia renal (CrCl >30mL/min): No se requieren ajustes de dosificación.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que por criterio médico el balance beneficio/riesgo sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. Este producto puede causar somnolencia durante su administración, evite actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Precauciones: Pacientes ancianos. Pacientes con angina de pecho, disfunción del ventrículo izquierdo, disfunción hepática, disfunción renal, enfermedad isquémica coronaria, patología del seno cardíaco (Sin marcapasos). Se desaconseja el consumo de alcohol durante el tratamiento debido al riesgo de hipotensión severa. El uso de este producto se ha asociado a la posibilidad de sufrir de mareo, somnolencia y fatiga, lo cual compromete la capacidad de conducir vehículos u operar maquinaria. La eficacia y seguridad de este producto no se ha establecido en pacientes menores a 18 años.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula. Pacientes con angina de pecho inestable, infarto agudo al miocardio reciente (Menor a 30 días), insuficiencia cardíaca congestiva no tratada, insuficiencia hepática y/o renal severa, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo.