



FEMIZOL 750mg-200mg ÓVULOS
Metronidazol – Nitrato de Miconazol

Composición: Cada óvulo contiene: Metronidazol 750mg, Nitrato de Miconazol 200mg, Grasa dura y Polietilenglicol.

Indicación: Tratamiento local de la candidiasis vaginal, tricomoniasis y vaginosis bacteriana.

Vía de administración: Vaginal.

Posología (Dosis recomendada): Mujeres adultas: Un (01) óvulo por vía vaginal una (01) vez al día, por siete (07) días continuos. No exceder de 1 óvulo por vía vaginal diario, el uso de dosis mayores no genera beneficios terapéuticos adicionales y, por el contrario, podría ocasionar la aparición de efectos adversos.

Dosificación en pacientes especiales:

Ancianos: No se requieren ajustes de dosificación.

Insuficiencia hepática: No se requieren ajustes de dosificación.

Insuficiencia renal: No se requieren ajustes de dosificación.

Advertencias: No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia a menos que por criterio médico el balance beneficio/riesgo sea favorable. De ser imprescindible su uso, por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase definitivamente la lactancia materna. Si durante el tratamiento, se presenta ardor o irritación severa en el sitio de aplicación o la aparición de una reacción adversa sistémica, sugestiva de hipersensibilidad, se debe suspender el uso de este medicamento y consultar al médico. La composición de este producto ha sido relacionado con la potenciación del efecto anticoagulante de la warfarina, por lo cual en caso de ser necesario el uso de este producto en combinación con warfarina,



se recomienda tomar precauciones y vigilar periódicamente los valores del Tiempo de Protrombina (TP) y el Cociente Internacional Normalizado (INR). Los excipientes utilizados en este producto, pudieran debilitar los preservativos y diafragmas a base de látex, por lo cual se recomienda evitar las relaciones sexuales mientras dure el tratamiento. No interrumpir el tratamiento antes del tiempo previsto aunque hayan desaparecido los signos y síntomas de la infección. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Evítese el uso indiscriminado de este producto debido a que aumenta el riesgo de aparición de reacciones adversas. Evite el consumo de bebidas alcohólicas. En pacientes con disfunción hepática, enfermedades del Sistema Nervioso Central y Periférico.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula.