



LOSARTÁN POTÁSICO 100mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Losartán potásico 100,000mg, Ciclamato de sodio 0,983mg, Glicolato sódico de almidón 18,250mg, Lactosa monohidratada 7,500mg, Sacarina de sodio 0,125mg y Excipientes c.s.p.

Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión arterial y de la insuficiencia cardíaca de moderada a severa. Protección renal en pacientes con diabetes mellitus tipo II con proteinuria. Reducción del riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada):

Adultos:

Tratamiento de la hipertensión arterial: 50mg a 100mg, una (01) vez al día. Dosis máxima: 100mg/día.

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca de moderada a severa: 25mg a 50mg, una (01) vez al día. Dosis máxima: 100mg/día.

Protección renal en pacientes con diabetes mellitus tipo II con proteinuria: 50mg a 100mg, una (01) vez al día. Dosis máxima: 100mg/día.

Reducción del riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular en pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda: 50mg a 100mg, una (01) vez al día. Dosis máxima: 100mg/día.

El uso de dosis mayores no genera beneficios terapéuticos adicionales y, por el contrario, podría ocasionar la aparición de efectos adversos.

Dosificación en pacientes especiales:

Ancianos: No se requieren ajustes de dosificación.



Insuficiencia hepática leve a moderada: Se recomienda iniciar con una dosis reducida <50mg/día, seguida por ajustes posteriores, en caso de ser necesario, según la respuesta clínica y la tolerancia individual de cada paciente. No existen datos de seguridad en pacientes con insuficiencia hepática severa.

Insuficiencia renal: No se requieren ajustes de dosificación.

Pediátricos: La eficacia y seguridad de este producto no se ha establecido en pacientes menores a 6 años.

Advertencias: Producto de uso delicado que sólo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso, por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase definitivamente la lactancia materna. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Se recomienda verificar el balance hidroelectrolítico antes de comenzar el tratamiento con este producto. Se recomienda realizar controles periódicos de los niveles séricos de potasio y creatinina, en especial en pacientes con insuficiencia renal. Durante el tratamiento, se deben realizar controles periódicos la función renal y, ante la aparición de un cuadro de disfunción clínicamente importante, se debe considerar la suspensión del medicamento. Pacientes ancianos. Pacientes con antecedentes de angioedema, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, estenosis arterial, estenosis valvular aórtica o mitral, insuficiencia cardíaca grave, insuficiencia hepática leve a moderada, insuficiencia renal.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula o a otros antagonistas de los receptores de angiotensina II. Durante el embarazo. Pacientes con hiperaldosteronismo primario, insuficiencia hepática grave.