



LUMBAX 400mg TABLETAS
Ibuprofeno

Composición: Cada tableta contiene: Ibuprofeno 400,00mg, Almidón pregelatinizado 11,76mg y Excipientes c.s.p.

Indicación: Tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada en condiciones inflamatorias y dolorosas como: Artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilosante, dolor menstrual, cefalea, dolor muscular, lumbalgias, dolor post-operatorio y post-cirugía dental.

Vía de Administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada): A menos que el médico indique otra dosis: Adultos: Una (01) tableta cada 6 u 8 horas al día. No exceder de 4 tabletas en 24 horas (2400mg/día).

Advertencias: No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que por criterio médico el balance beneficio/riesgo sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento. Si los síntomas persisten por más de 48 horas con el uso de este medicamento, suspenda el uso y consulte al médico. No exceda la dosis recomendada. Mantenga éste y todos los medicamentos, fuera del alcance de los niños.

Precauciones: En pacientes con asma bronquial, edema, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca leve a moderada, insuficiencia hepática leve a moderada, insuficiencia renal leve a moderada.



Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a otros antiinflamatorios no esteroideos. Mujeres embarazadas durante el primer trimestre o durante el parto. En pacientes con alteraciones de la coagulación, antecedentes de hemorragia gastrointestinal, dengue, enfermedad gastrointestinal inflamatoria, insuficiencia cardíaca grave, insuficiencia hepática severa, insuficiencia renal severa, úlcera gastroduodenal activa. En pacientes en tratamiento con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes o trombolíticos.