



OMEPRAZOL 20mg CÁPSULAS CON MICROGRÁNULOS ENTÉRICOS

Composición: Cada cápsula con microgránulos entéricos contiene: Omeprazol 20,00mg, Manitol 56,94mg, Sacarosa 115,30mg y Excipientes c.s.p.

Indicaciones: Tratamiento de esofagitis por reflujo, lesiones gastroduodenales producidas por antiinflamatorios no esteroideos (AINE's), síndrome de Zollinger-Ellison, úlceras gástricas y/o duodenales y cualquier otra patología asociada a hipersecreción gástrica.

Vía de administración: Oral.

Posología (Dosis recomendada):

Esofagitis por reflujo, úlcera gástrica y/o duodenal: 20mg una (01) vez al día por cuatro (04) semanas. En pacientes en los cuales no se observe mejoría, se recomiendan 40mg una (01) vez al día por cuatro (04) semanas (Úlcera duodenal) o por ocho (08) semanas (Esofagitis por reflujo y úlcera gástrica).

Lesiones producidas por AINE's: 20mg a 40mg una (01) vez al día por cuatro (04) semanas.

Zollinger-Ellison: 60mg una (01) vez al día.

Dosificación en pacientes especiales:

Ancianos: No se requieren ajustes de dosificación.

Insuficiencia hepática: Reducir la dosificación diaria a 10mg o 20mg.

Insuficiencia renal: No se requieren ajustes de dosificación.

Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico, el balance beneficio/riesgo sea favorable. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el



tratamiento. La reducción de la acidez gástrica por períodos prolongados de tiempo, puede favorecer el sobrecrecimiento de bacterias habituales del tracto gastrointestinal y dar lugar a infecciones, por lo que, en caso de presentarse diarrea persistente, dolor abdominal y fiebre, se debe considerar dicha posibilidad. Los tratamientos prolongados con Omeprazol, pueden reducir la absorción gastrointestinal de cianocobalamina (Vitamina B12). Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la sacarosa. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones: Deberá descartarse un proceso maligno antes de iniciar el tratamiento con Omeprazol, dado que éste podría aliviar los síntomas y retrasar el diagnóstico precoz. El uso en dosis elevadas y/o por tiempo prolongado se ha asociado a fracturas en pacientes ancianos y/o pacientes con factores de riesgo. Se deben monitorizar los niveles de magnesio en pacientes en tratamiento con digoxina o diuréticos. Pacientes con intolerancia a la sacarosa.

Contraindicaciones: Alergia a los componentes de la fórmula.